

Nermin Nikšić, s. r.

					Monoterapija indicirana za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog uroelnog karcinoma kod odraslih bolesnika koji su prethodno primili hemoterapiju koja sadrži platinu.
8.	L01FF02	pembrolizumab	inf	100 mg	Monoterapija indicirana za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog uroelnog karcinoma kod odraslih bolesnika koji nisu pogodni za hemoterapiju koja sadrži cisplatin i čiji tumori ekspiriraju PD-L1 sa kombinovanim pozitivnim rezultatom (CPS>10).

					Prema posebnoj preporuci nadležnog doktora medicine kao monoterapija za liječenje uznapredovalog (koji se ne može hirurški odstraniti ili metastatskog) melanoma kod odraslih. Kao monoterapija indiciran za prvu liniju liječenja metastatskog karcinoma pluća nemalih ćelija (NSCLC) kod odraslih čiji tumori ekspimiraju PD-L1 uz udio tumorskih ćelija sa ekspresijom (TPS) $\geq 50\%$ i koji nisu pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK. Kao monoterapija indiciran za liječenje lokalno uznapredovalog ili metastatskog NSCLC-a kod odraslih čiji tumori ekspimiraju PD-L1 uz TPS $\geq 1\%$ i koji su prethodno primili najmanje jedan hemoterapijski protokol. Bolesnici pozitivni na tumorske mutacije gena EGFR ili ALK trebaju također primiti ciljanu terapiju prije nego što primie nembrolizumab.
--	--	--	--	--	---

U Privitku 2. "Posebni program" u tabelarnom prikazu redni broj 11. se mijenja i glasi:

					Monoterapija u liječenju odraslih bolesnika sa relapsirajućim ili refraktornim klasičnim Hodgkinovim limfomom kod kojih je autologna transplantacija matičnih ćelija i liječenje brentuksimab vedotinom neuspješno ili koji nisu pogodni za transplantaciju i nisu odgovorili na brentuksimab. U kombinaciji sa hemoterapijom koja sadrži platinu za neoadjuvantno liječenje, a zatim u monoterapiji za adjuvantno liječenje, indiciran za liječenje resektabilnog karcinoma pluća nemalih ćelija kod odraslih koji su izloženi visokom riziku od recidiva. U kombinaciji sa hemoterapijom koja sadrži platinu i 5-fluorouracil (5-FU) indiciran za prvu liniju liječenja metastatskog ili neresektabilnog rekurentnog karcinoma skvamoznih ćelija glave i vrata kod odraslih bolesnika čiji tumori ekspresiraju PD-L1 sa CPS-om ≥ 1. Kao monoterapija indiciran za adjuvantno liječenje karcinoma pluća nemalih ćelija kod odraslih koji su izloženi visokom riziku od recidiva nakon potpune resekcije i hemoterapije zasnovane na platinu. U kombinaciji sa pemetreksedom i hemoterapijom koja sadrži platinu indiciran za prvu liniju liječenja metastatskog neskvamoznog karcinoma pluća nemalih ćelija kod odraslih čiji tumori nisu pozitivni na mutacije gena EGFR ili ALK. Kao monoterapija indiciran za adjuvantno liječenje odraslih bolesnika sa karcinomom bubrenih ćelija kod povećanog rizika od recidiva nakon nefrektomije ili nakon nefrektomije i resekcije metastatskih lezija. U kombinaciji sa hemoterapijom i bevacizumabom ili bez njega indiciran za liječenje perzistentnog, rekurentnog ili metastatskog karcinoma grlića maternice kod odraslih bolesnica čiji tumori ekspresiraju PD-L1 sa CPS-om ≥ 1. U kombinaciji sa hemoterapijom za neoadjuvantno liječenje, a zatim u monoterapiji za adjuvantno liječenje nakon hirurškog zahvata indiciran za liječenje odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili ranim trostruko negativnim rakom dojke sa visokim rizikom od recidiva. U kombinaciji sa hemoterapijom indiciran za liječenje lokalno recidivirajućeg neresektabilnog ili metastatskog trostruko negativnog karcinoma dojke kod odraslih bolesnika čiji tumori ekspresiraju PD-L1 sa CPS-om ≥ 10 i koji prethodno nisu primili hemoterapiju za metastatsku bolest. Kao monoterapija indiciran za adjuvantno liječenje melanoma stadija IIB, IIC ili III kod odraslih i adolescenata u dobi od 12 ili više godina koji su podvrgnuti potpunoj resekciji. U kombinaciji sa karboplatinom i paklitakselom ili nab-paklitakselom indiciran za prvu liniju liječenja metastatskog skvamoznog karcinoma pluća nemalih ćelija kod odraslih. U kombinaciji sa aksamitinom indiciran za prvu liniju liječenja uznapredovalog karcinoma bubrenih ćelija kod odraslih.
11.	L01FF02	pembrolizumab	inf	100 mg	

У табеларном приказу испод редног броја 11. се додаје нови редни број 11а. који гласи:

11а.	L01FF05	atezolizumab	инф инј	1200 mg 1875 mg	У монотерапији индичиран за адјувантно лијечење NSCLCа након потпуне ресекције и кетотерапије утемљене на платини у одраслих болесника с високим ризиком од рецидива чији тумори показују разину експресије PD-L1 $\geq 50\%$ на туморским станицама и који немају EGFR мутације ни ALK-позитиван NSCLC. У комбинацији с bevacizumabом, paklitaxelом и карбоплатином индичиран за прву линију лијечења одраслих болесника с метастатским neplanocelularним NSCLC-ом. У болесника с EGFR мутацијама или ALK-позитивним NSCLC-ом atezolizumab је у комбинацији с bevacizumabом, paklitaxelом и карбоплатином индичиран само након претходног неуспјешног лијечења одговарајућим циљаним терапијама. У монотерапији индичиран за прву линију лијечења узнапредовалог NSCLC-а у одраслих болесника који нису погодни за терапију темљену на платини. У комбинацији с карбоплатином и etoposidом индичиран за прву линију лијечења одраслих болесника с проширеним стадијем рака плућа малих станца (engl. extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC). У комбинацији с bevacizumabом индичиран за лијечење одраслих болесника с узнапредовалим или нересектабилним HCC-ом који претходно нису примали системску терапију.
------	---------	--------------	------------	--------------------	--

III.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

V. број 1305/2026
23. ружна 2026. године
Sарајево

Премијер
Nermin Nikšić, v. r.

На основу члана 44. став (1) Закона о апотекарској дјелатности ("Службене новине Федерације БиХ", број 40/10) на приједлог федералног министра здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 366. хитној сједници, одржаној 23.09.2026. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛИСТИ
ЛИЈЕКОВА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

I

У Одлуци о Листи лијекова фонда солидарности Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 47/19, 90/19, 58/23, 23/24, 100/24, 31/26, 56/26 - у даљњем тексту: Листа лијекова фонда солидарности), у Прилогу 1. "Цитостатици са посебним режимом прописивања" у табеларном приказу редни број 3а. се мијења и гласи:

3а.	L01FF05	atezolizumab	инф инј	1200 mg 1875 mg	У монотерапији индичиран за лијечење локално узнапредовалог или метастатског УК-а у одраслих болесника: - који су претходно примали кетотерапију која је садржавала платину, или - који се не сматрају погодним за лијечење цисплатином и чији тумори показују разину експресије PD-L1 $\geq 5\%$. У монотерапији индичиран за прву линију лијечења метастатског HCC-а у одраслих болесника чији тумори показују разину експресије PD-L1 $\geq 50\%$ на туморским станицама или $\geq 10\%$ на имуносним станицама које инфилтрирају тумор те који немају EGFR-мутацијама ни ALK-позитиван NSCLC. У монотерапији индичиран за лијечење локално узнапредовалог или метастатског NSCLC-а у одраслих болесника који су претходно примали кетотерапију. Болесници с EGFR-мутацијама или ALK-позитивним NSCLC-ом требали су такођер примати циљане терапије прије него што приме atezolizumab.
-----	---------	--------------	------------	--------------------	---

Редни број 8. у табеларном приказу мијења се и гласи:

8.	L01FF02	пембролизумаб	инф	100 mg	Монотерапија индичирана за лијечење локално узнапредовалог или метастатског уротелног карцинома код одраслих болесника који су претходно примали кетотерапију која садржи платину. Монотерапија индичирана за лијечење локално узнапредовалог или метастатског уротелног карцинома код одраслих болесника који нису погодни за кетотерапију која садржи цисплатин и чији тумори експримирају PD-L1 са комбинаваним позитивним резултатом (CPS ≥ 10). Према посебној препоруци надлежног доктора медицине као монотерапија за лијечење узнапредовалог (који се не може хируршки одстранити или метастатског) меланома код одраслих. Као монотерапија индичиран за прву линију лијечења метастатског карцинома плућа немалих ћелија (HNSCLC) код одраслих чији тумори експримирају PD-L1 уз удно туморских ћелија са експресијом (TPC) $\geq 50\%$ и који нису позитивни на туморске мутације гена EGFR или ALK. Као монотерапија индичиран за лијечење локално узнапредовалог или метастатског HNSCLC-а код одраслих чији тумори експримирају PD-L1 уз TPC $\geq 1\%$ и који су претходно примали најмање један кетотерапијски протокол. Болесници позитивни на туморске мутације гена EGFR или ALK требају такођер примати циљану терапију прије него што приме пембролизумаб.
----	---------	---------------	-----	--------	---

II

У Прилогу 2. "Посебни програм" у табеларном приказу редни број 11. се мијења и гласи:

11.	L01FF02	пембролизумаб	инф	100 mg	Монотерапија у лијечењу одраслих болесника са релапсирајућим или рефракторним класичним Ходжкиновим лимфомом код којих је аутологна трансплантација матичних ћелија и лијечење брентуксимаб водитином неуспјешно или који нису погодни за трансплантацију и нису одговорили на брентуксимаб. У комбинацији са кетотерапијом која садржи платину за неoadувантно лијечење, а затим у монотерапији за адјувантно лијечење, индичиран за лијечење ресектабилног карцинома плућа немалих ћелија код одраслих који су изложени високом ризику од рецидива. У комбинацији са кетотерапијом која садржи платину и 5-флуороурацил (5-FU) индичиран за прву линију лијечења метастатског или нересектабилног рекурентног карцинома сквамозних ћелија главе и врата код одраслих болесника чији тумори експримирају PD-L1 са CPS-ом ≥ 1 . Као монотерапија индичиран за адјувантно лијечење карцинома плућа немалих ћелија код одраслих који су изложени високом ризику од рецидива након потпуне ресекције и кетотерапије засноване на платини. У комбинацији са пемтрескесом и кетотерапијом која садржи платину индичиран за прву линију лијечења метастатског несквамозног карцинома плућа немалих ћелија код одраслих чији тумори нису позитивни на мутације гена EGFR или ALK. Као монотерапија индичиран за адјувантно лијечење одраслих болесника са карциномом бубрежних ћелија код повећаног ризика од рецидива након нефректомије или након нефректомије и ресекције метастатских лезија. У комбинацији са кетотерапијом и бевацизумабом или без њега индичиран за лијечење перзистентног, рекурентног или метастатског карцинома грлића материце код одраслих болесница чији тумори експримирају PD-L1 са CPS-ом ≥ 1 . У комбинацији са кетотерапијом за неoadувантно лијечење, а затим у
-----	---------	---------------	-----	--------	--

					монотерапији за адјувантно лијечење након хируршког захвата, индичиран за лијечење одраслих болесника са локално узнапредовалим или раним троstrуко негативним раком дојке са високим ризиком од рецидива. У комбинацији са хемотерапијом индичиран за лијечење локално рецидивирајућег нересектабилног или метастатског троstrуко негативног карцинома дојке код одраслих болесника чији тумори експримирају ПД-Л1 са ЦПC-ом ≥ 10 и који претходно нису примили хемотерапију за метастатску болест. Као монотерапија индичиран за адјувантно лијечење меланома стадија IIIB, IIIC или IIID код одраслих и адолесцената у доби од 12 или више година који су подвргнути потпуној ресекцији. У комбинацији са карбоплатином и паклитакселом или наб-паклитакселом индичиран за прву линију лијечења метастатског сквамозног карцинома плућа немалих ћелија код одраслих. У комбинацији са акситинибом индичиран за прву линију лијечења узнапредовалог карцинома бубрежних ћелија код одраслих.
--	--	--	--	--	---

У табеларном приказу испод редног броја 11. се додаје нови редни број 11а. који гласи:

11а.	L01FF05	атезолизумаб	инф ин	1200 мг 1875 мг	У монотерапији индичиран за адјувантно лијечење НCЦЦЦа након потпуно ресекције и хемотерапије утемељене на платини у одраслих болесника са високим ризиком од рецидива чији тумори показују ризину експресије ПДЛ1 $\geq 50\%$ на туморским станицама и који немају ЕГФР мутације ни АЛКпозитиван НCЦЦЦ. У комбинацији с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином индичиран за прву линију лијечења одраслих болесника са метастатским непланоцелуларним НCЦЦЦ-ом. У болесника с ЕГФР мутираним или АЛКпозитивним НCЦЦЦом атезолизумаб је у комбинацији с бевацизумабом, паклитакселом и карбоплатином индичиран само након претходног неуспјешног лијечења одговарајућим циљаним терапијама. У монотерапији индичиран за прву линију лијечења узнапредовалог НCЦЦЦ-а у одраслих болесника који нису погодни за терапију темелјену на платини. У комбинацији с карбоплатином и етопозидом индичиран за прву линију лијечења одраслих болесника с проширеним стадијем рака плућа малих станица (енгл. ектенсиве-стаге смалл целл лунг канцер, ЕС-ЦЦЦЦ). У комбинацији с бевацизумабом индичиран за лијечење одраслих болесника с узнапредовалим или нересектабилним ХЦЦ-ом који претходно нису примали системску терапију.
------	---------	--------------	-----------	--------------------	---

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

В. број 1305/2026

23. септембра 2026. године
Сарајево

Премијер
Нермин Никшић, с. р.

На основу члана 44. став (1) Закона о апотекарској дјелатности ("Службене новине Федерације БиХ", број 40/10) на приједлог федералног министра здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 366. hitnoj sjednici, održanoj 23.09.2026. године, donosi

**ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O LISTI
LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE**

I.

У Одлuci о Listи lijekova фonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Службене новине Федерације БиХ", br. 47/19, 90/19, 58/23, 23/24, 100/24, 31/26, 56/26 - у daljnjem tekstu: Lista lijekova fonda solidarnosti), у Prilogу 1. "Citostatici sa posebnim režimom propisivanja" у табеларном prikazu редни број 3а. се mijenja i гласи:

3а.	L01FF05	atezolizumab	инф ин	1200 мг 1875 мг	У монотерапији индичиран за лијечење локално узнапредовалог или метастатског UK-a у одраслих болесника: - који су претходно примали хемотерапију која је садржавала платину, или - који се не сматрају погодним за лијечење cisplatinом и чији тумори показују ризину експресије ПДЛ1 $\geq 5\%$. У монотерапији индичиран за прву линију лијечења метастатског NSCLC-a у одраслих болесника чији тумори показују ризину експресије PD-L1 $\geq 50\%$ на туморским станицама или $\geq 10\%$ на имуносним станицама које инфилтрирају тумор те који немају EGFR-mutirани ни ALK-pozitivan NSCLC. У монотерапији индичиран за лијечење локално узнапредовалог или метастатског NSCLC-a у одраслих болесника који су претходно примали хемотерапију. Болесници с EGFR-mutirаним или ALK-pozitivnim NSCLC-om требали су такође примати циљане терапије prije nego što prime atezolizumab.
-----	---------	--------------	-----------	--------------------	--

Редни број 8. у табеларном приказу mijenja се i гласи:

8.	L01FF02	pembrolizumab	инф	100 мг	Монотерапија индичирана за лијечење локално узнапредовалог или метастатског уротелног карцинома код одраслих болесника који су претходно примили хемотерапију која садржи платину. Монотерапија индичирана за лијечење локално узнапредовалог или метастатског уротелног карцинома код одраслих болесника који нису погодни за хемотерапију која садржи cisplatin и чији тумори експримирају PD-L1 са комбинованим позитивним резултатом (CPS≥ 10). Према посебној препоруци надлежног доктора медицине као монотерапија за лијечење узнапредовалог (који се не може хируршки одстранити или метастатског) melanoma код одраслих. Као монотерапија индичирана за прву линију лијечења метастатског карцинома плућа немалих ћелија (NSCLC) код одраслих чији тумори експримирају PD-L1 уз удјо туморских ћелија са експресијом (TPS) $\geq 50\%$ и који нису позитивни на туморске мутације gena EGFR или ALK. Као монотерапија индичирана за лијечење локално узнапредовалог или метастатског NSCLC-a код одраслих чији тумори експримирају PD-L1 уз TPS $\geq 1\%$ и који су претходно примили најмање један хемотерапијски протокол. Болесници позитивни на туморске мутације gena EGFR или ALK требају такође примити циљану терапију prije nego što prime pembrolizumab.
----	---------	---------------	-----	--------	--

II.

У Prilogу 2. "Posebni program" у табеларном prikazu редни број 11. се mijenja i гласи:

11.	L01FF02	pembrolizumab	инф	100 мг	Монотерапија у лијечењу одраслих болесника са relapsirajućim или refraktornim klasičnim Hodgkinovim limfomom код којих је autologna transplantacija матичних ћелија и лијечење brentuxsimab vedotinom неуспјешно или који нису погодни за transplantaciju и нису одговорили на brentuxsimab. У комбинацији са хемотерапијом која садржи платину за neoadjuvantно лијечење, а затим у монотерапији за адјувантно лијечење, индичиран за лијечење ресектабилног карцинома плућа немалих ћелија код одраслих који су изложени високим ризику од рецидива. У комбинацији са хемотерапијом која садржи платину и 5-fluorouracil (5-FU) индичиран за прву линију лијечења метастатског или нересектабилног rekurentnog карцинома skvamoznih ћелија главе и vrata код одраслих болесника чији тумори експримирају PD-L1 са CPS-ом ≥ 1. Као монотерапија индичирана за адјувантно
-----	---------	---------------	-----	--------	---

				liječenje karcinoma pluća nemalih ćelija kod odraslih koji su izloženi visokom riziku od recidiva nakon potpune resekcije i hemoterapije zasnovane na platini. U kombinaciji sa pemetreksedom i hemoterapijom koja sadrži platinu indiciran za prvu liniju liječenja metastatskog neskvamoznog karcinoma pluća nemalih ćelija kod odraslih čiji tumori nisu pozitivni na mutacije gena EGFR ili ALK. Kao monoterapija indiciran za adjuvantno liječenje odraslih bolesnika sa karcinomom bubrenih ćelija kod povećanog rizika od recidiva nakon nefrektomije ili nakon nefrektomije i resekcije metastatskih lezija. U kombinaciji sa hemoterapijom i bevacizumabom ili bez njega indiciran za liječenje perzistentnog, rekurentnog ili metastatskog karcinoma grlića maternice kod odraslih bolesnika čiji tumori ekspiriraju PD-L1 sa CPS-om ≥ 1. U kombinaciji sa hemoterapijom za neoadjuvantno liječenje, a zatim u monoterapiji za adjuvantno liječenje nakon hirurškog zahvata, indiciran za liječenje odraslih bolesnika sa lokalno uznapredovalim ili ranim trostruko negativnim rakom dojke sa visokim rizikom od recidiva. U kombinaciji sa hemoterapijom indiciran za liječenje lokalno recidivirajućeg neresektabilnog ili metastatskog trostruko negativnog karcinoma dojke kod odraslih bolesnika čiji tumori ekspiriraju PD-L1 sa CPS-om ≥ 10 i koji prethodno nisu primili hemoterapiju za metastatsku bolest. Kao monoterapija indiciran za adjuvantno liječenje melanoma stadija IIB, IIC ili III kod odraslih i adolescenata u dobi od 12 ili više godina koji su podvrgnuti potpunoj resekciji. U kombinaciji sa karboplatinom i paklitakselom ili nab-paklitakselom indiciran za prvu liniju liječenja metastatskog skvamoznog karcinoma pluća nemalih ćelija kod odraslih. U kombinaciji sa aksitinibom indiciran za prvu liniju liječenja uznapredovalog karcinoma bubrenih ćelija kod odraslih.
--	--	--	--	---

U tabelarnom prikazu ispod rednog broja 11. se dodaje novi redni broj 11a. koji glasi:

11a.	L01FF05	atezolizumab	inf inj	1200 mg 1875 mg	U monoterapiji indiciran za adjuvantno liječenje NSCLCa nakon potpune resekcije i kemoterapije utemeljene na platini u odraslih bolesnika s visokim rizikom od recidiva čiji tumori pokazuju razinu ekspresije PDL1 $\geq 50\%$ na tumorskim stanicama i koji nemaju EGFR mutacije ni ALKpozitivan NSCLC. U kombinaciji s bevacizumabom, paklitakselom i karboplatinom indiciran za prvu liniju liječenja odraslih bolesnika s metastatskim neplanocelularnim NSCLC-om. U bolesnika s EGFR mutiranim ili ALKpozitivnim NSCLCom atezolizumab je u kombinaciji s bevacizumabom, paklitakselom i karboplatinom indiciran samo nakon prethodnog neuspješnog liječenja odgovarajućim ciljanim terapijama. U monoterapiji indiciran za prvu liniju liječenja uznapredovalog NSCLC-a u odraslih bolesnika koji nisu pogodni za terapiju temeljenu na platini. U kombinaciji s karboplatinom i etopozidom indiciran za prvu liniju liječenja odraslih bolesnika s proširenim stadijem raka pluća malih stanica (engl. extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC). U kombinaciji s bevacizumabom indiciran za liječenje odraslih bolesnika s uznapredovalim ili neresektabilnim HCC-om koji prethodno nisu primili sistemsku terapiju.
------	---------	--------------	------------	--------------------	---

III.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 1305/2026
23. septembra 2026. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

1558

Na temelju članka 5. stav (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 366. žurnoj sjednici, održanoj 23.09.2026. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O LISTI LIJEKOVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

U Odluci o Listi lijekova obveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/24, 39/25 i 90/25), u Privitku 2. Preporučeni sadržaj prioriternih programa za lijekove koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, plućnoj hipertenziji, cističnoj fibrozi, kao i hormon rasta i drugim oboljenjima vrši se dopuna rednim brojem 22a., i to kako slijedi:

R.br.	ATC	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka - INN	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Medicinske indikacije	Režim propisivanja lijeka
22a	N07XX04	natrijum oksibat	oralni rastvor	500 mg/mL	80 mL rastvora u jantarnoj PET bočici od 200 m	Narkolepsija sa katapleksijom	Rp/Spec

II.

- (1) Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
- (2) Stupanjem na snagu ove odluke ista postaje obavezujuća i primjenjiva i za kantone.

V. broj 1306/2026
23. rujna 2026. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, v. r.

Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o lijekovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 109/12), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 366. hitnoj sjednici, održanoj 23.09.2026. godine, donosi

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O LISTI LIJEKOVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I

U Odluci o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/24, 39/25 i 90/25), u Прилогу 2. Препоручени садржај приоритетних програма за lijekove koji se koriste u terapiji bola, vještačkoj oplodnji, plućnoj hipertenziji, cističnoj fibrozi, kao i hormon rasta i drugim oboljenjima vrši se dopuna rednim brojem 22a., i to kako slijedi:

P. br.	ATC	Internacionalno nezaštićeno ime lijeka - INN	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Originalno pakovanje lijeka	Medicinske indikacije	Režim propisivanja lijeka
22a	N07XX04	natrijum oksibat	oralni rastvor	500 mg/mL	80 mL oralnog rastvora u jantarnoj PET bočici od 200 m	Narkolepsija sa katapleksijom	Rp/Spec