

# VODIČ ZA PACIJENTE

# HITNA MEDICINSKA POMOĆ I PRVA POMOĆ



# HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Hitna medicinska pomoć (HMP) podrazumijeva hitno medicinsko zbrinjavanje osoba kojima je zbog bolesti, stradanja ili povrede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela - odnosno kod kojih bi u kratkom vremenu moglo doći do životne ugroženosti - a u cilju maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do početka liječenja, odnosno do upućivanja na daljnje liječenje.

Analiza rada službi hitne medicinske pomoći pokazala je da je odnos između hitnih medicinskih slučajeva i onih koji to nisu 20%:80% u korist slučajeva koji nisu hitni, a što je rezultat uvriježenog mišljenja da hitna medicinska služba radi sve, od pregleda grla, ispiranja ušiju i kontrole krvnog pritiska do sklanjanja beskućnika i alkoholičara sa ulice itd...

Zbrinjavanjem stanja koja nisu hitna oduzima se mogućnost timu hitne medicinske pomoći da izade na neophodnu intervenciju, te se time umanjuje šansa za izlječenje i preživljavanje onih kojima je pomoć u tom trenutku nužna.



*Dostupnost i brzina reakcije odlučujući su za efikasnost HMP!  
Zato, ukoliko vam zbog bolesti, stradanja ili povrede, život nije  
u opasnosti, obratite se svom porodičnom ljekaru!  
Kućne posjete su djelokrug rada vašeg porodičnog ljekara!*

## Kada TREBA zatražiti HMP?

- ☞ zastoj rada srca i disanja (*cardiac arrest*)
- ☞ poremećaj stanja svijesti
- ☞ naglo nastao značajan nedostatak dah-a i otežano disanje
- ☞ iznenadno ubrzanje, usporenje rada srca ili nepravilni otkucaji srca
- ☞ visoke vrijednosti krvnog pritiska
- ☞ gušenje stranim tijelom
- ☞ znakovi srčanog udara (pritisak, stiskanje ili bol, pečenje ili žarenje iza grudne kosti, bol ili neugoda u jednoj ili obje ruke, leđima, vratu, donjoj vilici ili stomaku, nedostatak zraka, hladan znoj, mučnina, povraćanje ili gubitak orientacije)
- ☞ znakovi moždanog udara (iznenadna slabost ili trnjenje lica, ruke ili noge, posebno jedne strane tijela; iznenadna zbumjenost; otežan govor ili razumijevanje; iznenadni problemi s vidom na jednom ili oba oka ili nejednake zjenice; spušten jedan ugao usana; iznenadna jaka glavobolja; vrtoglavica; povraćanje; iznenadno otežan hod; gubitak ravnoteže; nekontrolirano mokrenje i stolica)
- ☞ krvarenje koje uprkos pritisku ne stane za 10 minuta
- ☞ neuobičajeno krvarenje na bilo koji od prirodnih otvora
- ☞ iznenadan i jak bol u glavi, grudima, stomaku, leđima...
- ☞ konvulzije (grčevi, padavica)
- ☞ povrede nastale u saobraćajnim i drugim nesrećama
- ☞ veće opekatine
- ☞ pothlađivanje
- ☞ toplotni udar
- ☞ udar struje ili groma
- ☞ utapanje
- ☞ ujed zmije
- ☞ alergijska reakcija na ubod insekta, na hranu i lijekove (otok usana i očnih kapaka, opća slabost, otežano disanje)
- ☞ trovanje lijekovima, plinom, teškim metalima, ugljenmonoksidom
- ☞ teško ili uporno povraćanje i/ili proliv
- ☞ osip s groznicom
- ☞ iznenadne promjene ponašanja koje dovode u opasnost bolesnika ili okolinu (pokušaj samoubistva ili ubistva)

## Kada NE TREBA zatražiti HMP?

- ☞ prehlada
- ☞ kašalj koji je tek počeo
- ☞ bolovi u zglobovima i mišićima
- ☞ grlobolja
- ☞ zujanje u uhu nakon ronjenja
- ☞ bol u uhu koji prolazi nakon korištenja analgetika
- ☞ alergijska reakcija ograničena na manju površinu kože
- ☞ manje opekomine ili ogrebotine
- ☞ lokalna reakcija na ubod komarca, krpelja i drugih insekata
- ☞ zubobolja
- ☞ povišena tjelesna temperatura unutar tri dana (normalne vrijednosti tjelesne temperature za odrasle su od 36 do 37°C mjereno pod pazuhom, a za manju djecu od 36,5 do 37,5°C mjereno rektalno)
- ☞ redovna terapija
- ☞ pisanje recepata za redovnu terapiju
- ☞ kontrola krvnog pritiska
- ☞ redovna zamjena urinarnog katetera
- ☞ upala mokraćnih puteva
- ☞ bolna menstruacija



**Ako niste sigurni da je vaše stanje hitno, najprije nazovite svog porodičnog ljekara!**

**Kada zatražite HMP telefonskim pozivom, ostanite smireni i dajte sljedeće informacije:**

- ☞ šta se dogodilo
- ☞ tačnu adresu na koju tim hitne pomoći treba doći
- ☞ telefonski broj s kojeg pozivate
- ☞ kome je potrebna pomoć, koliko osoba treba pomoći
- ☞ stanje osobe koja je povrijeđena ili bolesna (npr. je li osoba pri svijesti, diše li)
- ☞ ime i prezime te starost osobe kojoj treba pomoći
- ☞ ime i prezime osobe koja zove.

***Odgovarajući na pitanja medicinskog osoblja pomažete da oni vama pomognu!***

Naučite djecu i starije osobe kako nazvati HMP i koje informacije trebaju dati.



***Svaki nepotrebni ili lažni poziv zauzima telefonsku liniju i onemogućava da hitnu medicinsku pomoći dobiju oni čiji je život ugrožen!***

***Zauzeta telefonska linija znači da medicinsko osoblje razgovara sa osobom kojoj također treba pomoći!***

U slučaju potrebe i prema redu hitnosti, prvi slobodni tim HMP bit će upućen na adresu koju ste dali ili će vam dati savjet.



Dok se čeka dolazak tima HMP treba

- ☞ ostati smiren
- ☞ ništa ne jesti i ne piti
- ☞ osvijetliti kućna vrata i broj
- ☞ pripremiti zdravstvenu knjižicu i medicinsku dokumentaciju

**Pomozite timu HMP da vas što prije pronađe!**

Tim HMP koji dođe na mjesto događaja pregledat će pacijenta, obaviti dijagnostičke i terapijske postupke

U slučaju potrebe će prevesti ili organizirati prijevoz pacijenta u bolnicu



U visokorizičnim slučajevima, kada su u opasnost dovedeni bolesnik ili okolina, obavezno se aktiviraju policija i služba HMP. Policija osigurava područje, sprečava povređivanje, prijetnje pacijentu ili drugim osobama, te daljnje ozbiljne prijetnje. Tim HMP na mjestu događaja hitno zbrinjava pacijenta.

***Niko ni sebe ni druge ne smije dovesti u potencijalnu opasnost!***

Ako smatrate da vaše zdravstveno stanje ne zahtijeva dolazak tima HMP na vašu adresu, a ipak ne možete čekati početak radnog vremena vašeg porodičnog ljekara, nazovite HMP i upitajte za savjet ili uputite se u najbližu ambulantu HMP i po mogućnosti ponesite:

- ☞ zdravstvenu knjižicu
- ☞ popis lijekova (ili lijekove) koje trenutno uzimate
- ☞ rezultate pretraga (laboratorijske nalaze, rentgenske snimke...)
- ☞ ime i prezime porodičnog ljekara ili pedijatra (za djecu)
- ☞ hranu, boćice, prekrivače i igračke za djecu
- ☞ novac za prijevoz nazad kući taksijem ili javnim prijevozom
- ☞ mobilni telefon
- ☞ svojim najbližim javiti ili ostaviti poruku na vidljivom mjestu da ste otišli u službu hitne medicinske pomoći

Ako vaše zdravstveno stanje nije toliko hitno, medicinsko osoblje će vas:

- ☞ uputiti da se javite svom porodičnom ljekaru ili zamoliti da pričekate u čekaonici, te pozvati u najkraćem mogućem roku na pregled
- ☞ pregledati vas i dati terapiju
- ☞ ako vaše zdravstveno stanje bude zahtijevalo daljnje pretrage, ambulantno ili bolničko liječenje, organizirat će prijevoz do bolnice ukoliko je to potrebno
- ☞ prilikom pregleda, medicinsko osoblje može zamoliti člana vaše porodice da napusti ambulantu

***Roditelji djeteta treba da ostanu s djetetom cijelo vrijeme!***

**OBAVEZNO REĆI!**

- ☞ uzimate li neke lijekove, zašto i kada ih uzimate
- ☞ da li ste alergični na određenu hranu, lijekove ili ubode insekata
- ☞ jeste li trudni ili dojite

## **Osobe u težem zdravstvenom stanju imaju prednost pred osobama u lakšem zdravstvenom stanju!**

**Budite strpljivi dok čekate.**

*Iako je čekaonica prazna, medicinsko osoblje možda u tom trenutku pruža pomoć osobi koja je u teškom zdravstvenom stanju.*

**Zabranjeno je pušiti u zdravstvenim ustanovama.**

*Nasilje, prijetnje ili verbalno zlostavljanje bilo koje osobe neće biti tolerirani. U slučaju potrebe bit će pozvani policijski službenici kako bi zaštitili medicinsko osoblje i druge pacijente.*

**Ophodite se s poštovanjem prema medicinskom osoblju i drugim ljudima.**

*Ako ste u bolnicu prevezeni vozilom hitne medicinske pomoći, u većini slučajeva morat ćete sami organizirati povratak kući. Nakon što vas prevezu u bolnicu, tim hitne medicinske pomoći ne može čekati kako bi vas vratio na kućnu adresu. Timovi hitne medicinske pomoći moraju pomoći drugim osobama koje mogu biti životno ugrožene.*

**Ako smatrate da se osjećate bolje i želite otići iz ambulante HMP, slobodni ste to učiniti. Molimo vas da se prije odlaska javite medicinskom osoblju.**

*Ako napustite ambulantu ili vozilo hitne medicinske pomoći ili hitni prijem bolnice prije nego vas pregleda ljekar - ili kada to učinite uprkos savjetu ljekara - ustanova, odnosno služba hitne medicinske pomoći nisu i ne mogu biti odgovorni za pogoršanje vašeg zdravstvenog stanja. U većini situacija od vas će tražiti da potpišete odbijanje intervencije hitnog tima.*



# ŠTA JE PRVA POMOĆ?

Prva pomoć predstavlja skup mjera, postupaka i aktivnosti koje provodi osoba koja je prva u prilici da pruži pomoć unesrećenom neposredno nakon povrede ili iznenadne bolesti. Ona je samo prvi korak u lancu spašavanja života ugroženoj osobi na samom mjestu povređivanja ili razbolijevanja (kuća, radno ili javno mjesto itd.), i prethodi onome što će uraditi hitna medicinska pomoć.

## CILJEVI

- ☞ spašavanje života
- ☞ sprečavanje nastanka trajnih posljedica
- ☞ skraćivanje trajanja liječenja

## POSTUPCI

- ☞ poduzimanje neodgovarajućih mjera za spašavanje života
- ☞ pozivanje pomoći
- ☞ pružanje prve pomoći

## TEMELJNA NAČELA

- ☞ ne panicirati
- ☞ voditi brigu o sigurnosti spasilaca i unesrećenih
- ☞ ne štetiti
- ☞ ne raditi više nego što treba



## ZASTOJ RADA SRCA I DISANJA (prestanak životnih funkcija)

### SIMPTOMI

- ☞ gubitak svijesti
- ☞ prestanak disanja
- ☞ prestanak cirkulacije (srčanog rada)

Provjeriti životne funkcije:

- ✓ pokušati uspostaviti kontakt
- ✓ podići vilicu pacijentu i provjeriti ima li disanja
- ✓ pipati puls na krvnim sudovima, u trajanju od 10 sec.



### PRVA POMOĆ

- ☞ ako nema životnih funkcija, pozvati HMP i osobe educirane za upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora (ako imate informaciju da u blizini postoji instaliran AED).
- ☞ postaviti pacijenta na tvrdnu ravnu podlogu i početi s pritiscima na sredinu grudne kosti 5-6 cm u dubinu i oko 100 pritisaka u minuti.



Ove postupke radite do dolaska tima hitne medicinske pomoći ili dok ne iscrpite snagu.



Ukoliko znate i imate čime, nakon svakih 30 pritisaka podignite vilicu pacijentu i napravite dva udisaja.

## GUBITAK SVIJESTI



### SIMPTOMI

- ☞ ne uspostavlja se kontakt (nema verbalnog odgovora)
- ☞ ne otvara oči na poziv
- ☞ nema svršishodnih pokreta ekstremiteta na komandu ili bol
- ☞ može krkljati u grlu pri disanju, imati grčenja i trzaje tijela, povraćati...

### PRVA POMOĆ

- ☞ pozvati hitnu medicinsku pomoć!



- ☞ postaviti pacijenta u bočni položaj!
- ☞ ako povraća, otvoriti pacijentu usta da izađe povraćeni sadržaj
- ☞ ako ima grčenja, pridržati pacijenta i obezbijediti da ne dođe do povrede
- ☞ držati dišni put otvorenim pridržavanjem podignute vilice.



- ☞ ako krkla u grlu pri disanju, podići vilicu (ne čupati jezik)

## SRČANI UDAR



### SIMPTOMI

- ☞ neugoda u grudima koja traje duže od nekoliko minuta ili dolazi na mahove (pritisak, stiskanje ili bol, pečenje ili žarenje iza grudne kosti)
- ☞ neugoda u ostalim dijelovima gornjeg dijela tijela (bol ili neugoda u jednoj ili obje ruke, leđima, vratu, donjoj vilici ili stomaku)
- ☞ nedostatak zraka
- ☞ hladni znoj, mučnina, povraćanje ili gubitak orientacije

### PRVA POMOĆ

- ☞ bolesnik treba mirovati, najbolje u polusjedećem položaju
- ☞ ne smije se naprezati
- ☞ pozovite hitnu medicinsku pomoć ili prevezite bolesnika što prije do najbliže medicinske ustanove



## MOŽDANI UDAR

### SIMPTOMI

- ☞ iznenadna slabost ili trnjenje lica, ruke ili noge, posebno jedne strane tijela
- ☞ iznenadna zbumjenost, otežan govor ili razumijevanje
- ☞ iznenadni problemi s vidom na jednom ili oba oka, nejednake zjenice
- ☞ iskrivljena usta
- ☞ iznenadna jaka glavobolja, vrtoglavica, povraćanje
- ☞ iznenadno otežan hod, posrtanje, gubitak ravnoteže
- ☞ nekontrolirano mokrenje ili stolica

### PRVA POMOĆ

- ☞ bolesnik treba ležati s lagano uzdignutom glavom i ramenima
- ☞ ako počne povraćati, okrenite ga na bok da omogućite istjecanje povraćenog sadržaja iz usta
- ☞ pozovite hitnu medicinsku pomoć
- ☞ ne dajte bolesniku hranu niti piće
- ☞ ako je bolesnik bez svijesti, okrenite ga na bok ili postavite u tzv. koma položaj, položaj spavača



## EPILEPSIJA (PADAVIDA)

### SIMPTOMI

- ☞ mučnina u trbuhu
- ☞ nekontrolirani pokreti
- ☞ nagli gubitak svijesti
- ☞ grčevi mišića cijelog tijela
- ☞ pjena na ustima
- ☞ nekontrolirano mokrenje,  
rjeđe i stolica
- ☞ nemir, agresivnost  
i dezorientiranost



### PRVA POMOĆ

- ☞ osigurati prohodnost dišnih puteva  
okretanjem bolesnika u bočni položaj
- ☞ osigurati da bolesnik ne udara glavom  
o tvrdou podlogu (ispod glave postaviti  
mekan predmet kao što su jastuk, jakna itd.)
- ☞ otkopčati kragnu, razvezati kravatu
- ☞ pozvati hitnu pomoć i sačekati je  
s bolesnikom



**Napomena:** Ne davati pacijentu nikakvu tečnost na usta u fazi napada i dok ne dođe sebi. Ne stavljati mu nikakve predmete u usta, ne čupati jezik, ne pokušavati silom otvarati usta, ne pokušavati silom zaustaviti grčenje!

## TRAUMATSKE POVREDE (PRIJELOM KOSTI)

- ☞ ne pomjerati povrijeđenog dok povreda ne bude imobilizirana (za imobilizaciju se mogu koristiti savijene novine ili komadi drveta. Svaki tvrdi predmet je potrebno omotati najprije zavojem, vatom ili komadom odjeće kako ne bi nastale dodatne povrede)
- ☞ ne skidati odjeću i obuću prije postavljanja udlage kako se ne bi izazvali bolovi i pomak ulomaka
- ☞ zaustaviti krvarenje ako ga ima i utopliti povrijeđenog
- ☞ pozvati hitnu medicinsku pomoć
- ☞ bolesnik treba da leži na ravnoj podlozi, blago podignutih nogu (ako nisu povrijedjene)
- ☞ ako se sumnja na povredu glave, vrata ili kičme, bolesnik se ne smije pomjerati



**Osobe povrijeđene u saobraćajnoj nesreći, ukoliko nisu životno ugrožene,  
nemojte sami vaditi iz automobila jer postoji mogućnost  
da imaju povredu kičme**



## GUŠENJE STRANIM TIJELOM

### SIMPTOMI

Strano tijelo može zapeti u grkljanu, dušniku ili niže u bronhima. Pri djelimičnoj neprolaznosti:

- ☞ čuje se hroptavo disanje
- ☞ hvata se zrak
- ☞ postoji nadražajni kašalj
- ☞ glasovi su izobličeni

### PRVA POMOĆ

Ako osoba ima simptome teže opstrukcije dišnog puta a pri svijesti je:



#### Obično pomaže snažno kašljivanje

stranog tijela, i to do pet puta poslije svakog udarca provjerite da li je došlo do izbacivanja stranog tijela i uklonite samo strano tijelo koje je vidljivo u usnoj šupljini

Ako to ne pomogne, izvedite spasonosni hvat:

- ☞ stanite unesrećenome iza leđa i obuhvatite ga rukama
- ☞ stisnutu šaku prislonite na gornji dio stomaka, između pupka i vrha grudne kosti
- ☞ drugom šakom obuhvatite prvu
- ☞ brzo i snažno pritisnite stomak prema unutra i gore

**Zahvat ponovite 5 puta**



## Postupak kod djece starosti do godinu:

- ☞ dijete treba položiti potruške na svoju podlakticu tako da glava leži na dlanu i usmjerena je prema dolje (ukoliko ste u mogućnosti sjedite i svoju podlakticu oslonite na svoju natkoljenicu)
- ☞ pet puta udariti korijenom dlana između lopatica
- ☞ okrenuti dijete i provjeriti da li je ispalo strano tijelo. Ako ga vidite u ustima, oprezno ga izvaditi prstima
- ☞ ako to ne uspije, gura se preko sredine srednje trećine grudne kosti (to je između bradavica) s dva prsta do pet puta
- ☞ provjerite vidite li strano tijelo u ustima
- ☞ ako ga ne vidite, okrenite dijete na svoju podlakticu i ponovite postupak



## Postupak kod djeteta starijeg od godine:

- ☞ ako je dijete svjesno, naslonite ga preko svoje natkoljenice i udarite korijenom dlana između lopatica
- ☞ ukoliko je dijete bez svijesti, položite ga na tvrdu podlogu (tlo) i korijenom dlana jedne ili obje ruke (ovisno o veličini djeteta), položenog između pupka i vrha grudne kosti, pritisnite prema unutra i gore pet puta
- ☞ provjerite je li strano tijelo u ustima
- ☞ ako nije, ponovite postupak



## KRVARENJE

- ☞ **Direktni pritisak** gazom ili drugom tkaninom postavljenom na mjesto krvarenja. Ako se krvarenje nastavi, nemojte uklanjati već postavljenu gazu, dodajte više gaza na vrhu i primijenite veći pritisak.
- ☞ **Pritisak na arteriju iznad rane.** To su obično natkoljenična i nadlaktična arterija. Primjenjuje se kada direktni pritisak na ranu ne zaustavlja krvarenje ili kad ne raspoložemo kompresivnim zavojem. Ovo je dopuna direktnom pritisku.
- ☞ **Povrijedjeni ekstremitet** (ruku ili nogu) treba držati u povišenom položaju.

### Kod krvarenja iz nosa:

- ☞ jako pritisnuti na mekani dio nosa i sačekati nekoliko minuta.
- ☞ izmjeriti vrijednost krvnog pritiska.

## UDAR STRUJE

- ☞ nemojte sebe dovoditi u opasnost doticanjem žrtve dok je struja još uključena
- ☞ nemojte prilaziti žrtvi, niti pokušati pomjeriti žice dok struja ne bude isključena
- ☞ sve žrtve udara strujom zahtijevaju medicinsku procjenu, jer obim povreda ne mora biti vidljiv
- ☞ nazvati hitnu medicinsku pomoć

## TOPLITNI UDAR

### SIMPTOMI

- ☞ mučnina
- ☞ vrtoglavica
- ☞ grčevi mišića
- ☞ osjećaj slabosti
- ☞ glavobolja
- ☞ teško znojenje
- ☞ konfuzija
- ☞ epileptični napadi

### PRVA POMOĆ

- ☞ pacijenta skloniti u hladniji prostor (u hladovinu)
- ☞ odmah započeti hlađenje, poželjno uranjanjem do brade u hladnu vodu ili umotati u mokru tkaninu
- ☞ što prije pozvati hitnu medicinsku pomoć
- ☞ žrtvu ne forsirati da pije tečnost

## TROVANJE

Ako pacijent pokazuje bilo kakve znakove životno ugrožavajućeg stanja, kao što su pospanost, epileptični napadi, poteškoće u disanju, povraćanje, nakon izloženosti otrovu odmah pozovite službu hitne medicinske pomoći.

**Savjet:** Nemojte žrtvama ništa davati na usta. Nema adekvatnog dokaza da uzimanje vode ili mlijeka donosi benefit ovim pacijentima tokom pružanja prve pomoći.

Ako posumnjate na trovanje plinom, otvorite prozore i vrata i unesrećene izvedite napolje što prije!

## OPEKOTINE

- ☞ što prije započeti hlađenje opečene površine hladnom vodom iz slavine (15°do 25°C) i nastaviti hlađenje dok bol ne umanji
- ☞ nemojte direktno na opekotinu stavljati led, može uzrokovati oštećenje tkiva (tkivnu ishemiju)
- ☞ nastale plikove prekrijte sterilnim pokrovom, mjehuriće ostavite netaknute, jer oni poboljšavaju zarastanje i smanjuju bol

## UJED ZMIJE

- ☞ otkloniti opasnost, provjeriti svijest i ostaviti žrtvu u ležećem položaju
- ☞ zvati hitnu medicinsku pomoć
- ☞ smirivati žrtvu kako bi se usporilo širenje otrova
- ☞ primijeniti imobilizaciju, previti ujedeno mjesto odozgo (iznad mjesta ujeda) prema dolje, pokriti što više (ne skidajte zavoj)
- ☞ pratiti disanje, cirkulaciju (puls), nivo svijesti
- ☞ dati unesrećenom vodu u većim količinama da pije
- ☞ ne dizati ujedeni ekstremitet, jer pojačava venski dotok do vitalnih organa
- ☞ ukloniti nakit sa prstiju ukoliko je ujed na ruci

### Šta ne smijete uraditi!!!

- ☞ isisavati otrov ustima
- ☞ upućivati žrtvu na hodanje ili trčanje
- ☞ paničiti



# SAMOLJEČENJE

Samolječenje je uzimanje lijekova bez savjeta ljekara. Poželjno je ako se lijek može uzimati bez rizika, za suzbijanje simptoma kraćeg trajanja i s lijekovima čije su granice sigurnosti i neškodljivosti prilično velike. O uzimanju ovakvih lijekova konsultirajte se s farmaceutom prilikom kupovine lijeka.

## Oprez!

- ☞ uvijek trebate znati gdje se nalaze vaši lijekovi
- ☞ provjerite rok trajanja na kutiji prilikom uzimanja
- ☞ lijekove obavezno čuvajte van domaća djece
- ☞ uvijek pročitajte upute koje se nalaze na kutiji lijeka ili, ukoliko postoji, uputu koja je priložena uz lijek

***Antibiotike ne smijete koristiti bez odobrenja ljekara!***

## Šta treba imati u kućnoj apoteci?

- ☞ lijek za sniženje temperature (antipiretik)
- ☞ sredstvo protiv kašlja i za olakšavanje iskašljavanja (biljni sirup)
- ☞ tablete protiv bolova (analgetike)
- ☞ sredstvo za nadoknadu tečnosti i elektrolita (rehidraciju) kod povraćanja i proljeva
- ☞ probiotik, za lakši proliv
- ☞ sredstvo za odbijanje insekata
- ☞ mast protiv lokalne alergije na ubod insekta
- ☞ dezinfekcionalno sredstvo za povrede (antiseptik za posjekotine i ogrebotine)
- ☞ ljepljive trake - flastere u nekoliko veličina
- ☞ sterilne gaze različitih veličina, zavoje različite širine i dužine
- ☞ topломjer
- ☞ tlakomjer

## Oprez kada se radi od djeci!

U nekim situacijama možete i ublažiti simptome određenih bolesti, ali je potreban poseban oprez kada se radi o djeci. Posebno se to odnosi na **novorođenčad i dojenčad** do godine starosti, jer se bolest kod male djece može odvijati veoma brzo. Dijete treba hitno odvesti na pregled ako ima temperaturu 40 C. Do tada, preporuka je rashladiti ga tuširanjem u mlakoj vodi (ne tuširati glavu i lice) do 20 minuta ili umotavanjem u čaršafe ili drugu mekanu tkaninu natopljenu u mlakoj vodi. Voda na ovaj način oduzima tijelu znatnu količinu toploće.

Potrebno je pojiti dijete.

Ako postoji sumnja na stanje ili bolest koja životno ugrožava, treba odmah otići ljekaru.

## TELEFONSKI BROJEVI HITNIH MEDICINSKIH SLUŽBI U FEDERACIJI BiH

### UNSKO-SANSKI KANTON / ŽUPANIJA

Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijankić"  
Bihać-Urgentni centar / ☎ 037 318 812

Dom zdravlja Bihać / ☎ 037 312 412

Dom zdravlja Cazin / ☎ 037 515 426

Dom zdravlja Velika Kladuša / ☎ 037 773 094

Dom zdravlja Bužim / ☎ 037 410 078

Dom zdravlja Bosanska Krupa  
☎ 037 472 094

Dom zdravlja Bosanski Petrovac  
☎ 037 883 687

Dom zdravlja Ključ / ☎ 037 662 662

Dom zdravlja Sanski Most / ☎ 037 686 699

### POSAVSKI KANTON / ŽUPANIJA

Dom zdravlja Orašje / ☎ 031 744 031

Dom zdravlja Odžak / ☎ 031 761 048

### TUZLANSKI KANTON / ŽUPANIJA

Dom zdravlja Banovići / ☎ 035 875 994

Dom zdravlja Gračanica / ☎ 035 369 202

Dom zdravlja Gradačac / ☎ 035 816 094

Dom zdravlja Kalesija / ☎ 035 631 015

Dom zdravlja Kladanj / ☎ 035 369 136

Dom zdravlja Čelić / ☎ 035 660 015

Dom zdravlja Lukavac / ☎ 035 553 394

Dom zdravlja Srebrenik / ☎ 035 369 270

Dom zdravlja Tuzla / ☎ 035 311 500

Dom zdravlja Sapna / ☎ 035 597 517

Dom zdravlja Živinice / ☎ 035 773 994

Dom zdravlja Doboј-Istok / ☎ 035 369 527

Dom zdravlja Teočak / ☎ 035 755 582

### ZENIČKO-DOBOSKI KANTON / ŽUPANIJA

Dom zdravlja Zenica / ☎ 032 402 354 i (124)

Dom zdravlja Visoko / ☎ 032 735 260 i (124)

Dom zdravlja Zavidovići / ☎ 032 878 382 i (124)

Dom zdravlja Maglaj / ☎ 032 603 309 i (124)

Dom zdravlja Vareš / ☎ 032 843 034 i (124)

Dom zdravlja Žepče / ☎ 032 880 125 i (124)

Dom zdravlja Tešanj / ☎ 032 650 102 i (124)

Dom zdravlja Breza / ☎ 032 783 288 i (124)

Dom zdravlja Olovo / ☎ 032 828 080 i (124)

Dom zdravlja Usora / ☎ 032 893 426 i (124)

Dom zdravlja Kakanj / ☎ 032 460 958 i (124)

Dom zdravlja Doboј-Jug / ☎ 032 691 624

### BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON / ŽUPANIJA

Prijemno-urgentni centar  
Kantonalne bolnice Goražde / ☎ 038 241 261

## VODIČ ZA PACIJENTE

### **SREDNJOBOSANSKI KANTON / ŽUPANIJA**

Dom zdravlja Travnik / ☎ 124

Dom zdravlja Donji Vakuf  
☎ 030 205 450 ili 205 562- centrala

Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje  
☎ 030 265-502

Dom zdravlja Jajce / ☎ 030 659-000

Dom zdravlja Bugojno  
☎ 030 251 175 ili 124

Dom zdravlja Novi Travnik  
☎ 030 793-071 - centrala i poslije 15h  
prebaci na hitnu ili 124

Dom zdravlja Vitez / ☎ 030 715 181 ili 124

Dom zdravlja Busovača 124

Dom zdravlja Kiseljak / ☎ 030 879-157

Dom zdravlja Kreševac / ☎ 030 806-511

Dom zdravlja Fojnica / ☎ 030 831-342 ili 124

### **HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON / ŽUPANIJA**

Sveučilišna klinička  
bolnica Mostar / 036 336 140

Kantonalna bolnica  
RMC "Dr. Safet Mujić" / ☎ 036 503 102

Opća bolnica Konjic / ☎ 036 712 524

Dom zdravlja Mostar / ☎ 036 335 500

Dom zdravlja Stolac / 036 853 444

Dom zdravlja Stolac-Uzinovići / ☎ 036 858 410

Dom zdravlja Rama / ☎ 036 771 150

Dom zdravlja Šćipe / ☎ 036 285 107

Dom zdravlja Čapljina / ☎ 036 806 156

Dom zdravlja Čitluk / ☎ 036 641 040

Dom zdravlja Neum / ☎ 036 880 194

Dom zdravlja Ravno / 036 891 002

Dom zdravlja Jablanica / ☎ 036 753 794  
☎ 036 752 822

Dom zdravlja Stari Grad-Mostar / ☎ 124

Dom zdravlja Konjic / ☎ 036 712 524

### **ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON / ŽUPANIJA**

Dom zdravlja Grude / ☎ 039 662 162

Dom zdravlja Posušje / ☎ 039 681 124

Dom zdravlja Ljubuški / ☎ 039 831 514

Dom zdravlja Široki Brijeg  
☎ 039 704 089 / ☎ 039 705 233

### **KANTON / ŽUPANIJA SARAJEVO**

Zavod za hitnu medicinsku pomoć  
☎ 124 ili ☎ 033 611 111

Savjet ljekara / ☎ 033 722 345

### **KANTON / ŽUPANIJA 10**

Dom zdravlja Livno / ☎ 034 200 546

Dom zdravlja Tomislavgrad / ☎ 034 356 124

Dom zdravlja Kupres / ☎ 034 274 025

Dom zdravlja Glamoč / ☎ 034 273 052

Dom zdravlja Drvar / ☎ 034 819 994

Dom zdravlja Drvar-ambulanta  
Bosansko Grahovo / ☎ 034 850 104

# I Z D A V A N J E V O D I Č A P O D R Ž A L I

Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  
Federacije Bosne i Hercegovine

Univerzitetski klinički centar Sarajevo

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo



Science For A Better Life



**(C) Copyright:**

Udruženje za razvoj društva "KAP"

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Posavskog kantona / županije

**Lektor:** Elirija Hadžiahmetović

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona / županije

**Konsultativna podrška:**

Federalno ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadno-hercegovačkog kantona / županije

Ministarstvo za socijalnu politiku,  
zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  
Bosansko-podrinjskog kantona / županije

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike  
Unsko-sanskog kantona / županije

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite  
Hercegovačko-neretvanskog kantona / županije

Ministarstvo zdravstva  
Zeničko-dobojskog kantona / županije

Ministarstvo rada, zdravstva,  
socijane skrbi i prognanih, Kanton / Županija 10

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike  
Srednjobosanskog kantona / županije

Dom zdravlja Mostar

Ministarstvo zdravstva Kantona / Županije Sarajevo

Kantonalna bolnica Zenica

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

# Kako pomoći sebi i drugima u hitnim situacijama

Vodič izrađen u okviru IPA projekta:  
"Jadranski model održive mobilnosti u oblasti zdravstvene zaštite - AdriHealthMob"



© Copyright

